


ESOFAGO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. ESOFAGO

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	154	29
% sul totale	0,5	0,1
Tasso grezzo	4,2	0,8
Tasso standardizzato	4,3	0,7
Rischio cumulativo	0,3	0
Età media	65,9	72,8
Età mediana	67	73
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,74	0,42
Oss/Att Centro (2008-2013)	1,15	0,46
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,57	0,33
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,23	0,75


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. ESOFAGO

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	10	4,00	1,30	2	0,68	0,48
2006	18	7,33	1,77	2	0,65	0,46
2007	13	5,01	1,41	4	1,25	0,63
2008	19	7,13	1,65	2	0,63	0,45
2009	8	2,93	1,04	3	0,76	0,44
2010	5	1,74	0,78	3	0,83	0,49
2011	14	5,45	1,47	2	0,59	0,43
2012	13	4,69	1,31	2	0,67	0,48
2013	16	5,78	1,45	1	0,34	0,34
2014	11	3,85	1,17	3	1,02	0,59
2015	4	1,36	0,68	2	0,58	0,41
2016	10	3,41	1,09	3	0,79	0,49
2017	13	4,41	1,23	0	0,00	0,00




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza ESOFAGO

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	0,00	0,00
20-24	0,00	0,00
25-29	0,00	0,00
30-34	0,00	0,00
35-39	1,12	0,00
40-44	1,42	0,00
45-49	4,28	0,00
50-54	5,70	0,37
55-59	5,38	1,21
60-64	8,67	1,38
65-69	12,99	1,97
70-74	14,26	2,53
75-79	11,97	3,11
80-84	9,48	1,96
85+	17,84	3,01




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. ESOFAGO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	33,30	43,98	51,33
2a_M	21,66	23,48	23,76
3a_M	18,93	16,68	15,13
4a_M	14,51	16,90	15,13
5a_M	9,91	15,19	15,13
1a_F	65,08	37,44	20,85
2a_F	51,40	28,24	20,88
3a_F	35,20	28,43	20,90
4a_F	26,94	28,54	20,90
5a_F	27,73	28,58	20,90



Anno 2017. Prevalenza osservata. ESOFAGO

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	12	4,28	0	0,00
2010	13	4,64	1	0,34
2011	14	5,00	3	1,03
2012	17	6,07	3	1,03
2013	17	6,07	3	1,03
2014	19	6,78	3	1,03
2015	20	7,14	4	1,38
2016	21	7,50	5	1,72
2017	21	7,50	5	1,72



Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. ESOFAGO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Cervicale	24	15,60		Cervicale	3	10,30
Toracico	23	14,90		Toracico	5	17,20
Addominale	0	0,00		Addominale	0	0,00
Terzo superiore	6	3,90		Terzo superiore	2	6,90
Terzo medio	32	20,80		Terzo medio	5	17,20
Terzo inferiore	46	29,90		Terzo inferiore	10	34,50
Lesione sconfinante	5	3,20		Lesione sconfinante	1	3,40
Non specificato	18	11,70		Non specificato	3	10,30

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. ESOFAGO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Squamocellulare	83	60,58		Squamocellulare	18	75,00
Adenocarcinoma	34	24,82		Adenocarcinoma	4	16,67
Carcinoma NAS	8	5,84		Carcinoma NAS	1	4,17
Altre morfologie	10	7,30		Altre morfologie	1	4,17
Non specificato	2	1,46		Non specificato	0	0,00

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

