


LINFOMA DI HODGKIN

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. LINFOMA DI HODGKIN

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	145	132
% sul totale	0,5	0,6
Tasso grezzo	3,9	3,4
Tasso standardizzato	3,8	3,4
Rischio cumulativo	0,3	0,3
Età media	41,2	40,3
Età mediana	36	35
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,92	1
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,78	0,92
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,91	0,99
Oss/Att Sud (2008-2013)	0,98	1,07


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. LINFOMA DI HODGKIN

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	10	3,09	0,98	8	2,51	0,90
2006	6	1,86	0,76	8	2,62	0,93
2007	16	5,66	1,44	10	3,16	1,00
2008	7	2,38	0,90	10	3,31	1,05
2009	13	4,44	1,24	14	4,35	1,17
2010	9	2,94	0,98	12	4,11	1,19
2011	13	4,71	1,32	11	3,54	1,07
2012	11	4,05	1,23	12	3,92	1,14
2013	13	4,51	1,25	10	3,61	1,15
2014	6	2,07	0,85	10	3,71	1,18
2015	10	3,42	1,08	5	1,86	0,83
2016	6	2,07	0,85	16	5,58	1,41
2017	25	8,42	1,69	6	2,11	0,87




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza LINFOMA DI HODGKIN

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	1,14	0,61
10-14	1,56	2,79
15-19	7,50	8,01
20-24	8,15	5,88
25-29	6,11	8,09
30-34	5,47	4,03
35-39	3,36	4,87
40-44	4,25	1,75
45-49	3,92	3,14
50-54	1,90	2,59
55-59	1,66	2,81
60-64	2,89	1,38
65-69	3,79	1,97
70-74	4,75	3,54
75-79	3,99	4,15
80-84	5,69	3,26
85+	2,75	0,00




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. LINFOMA DI HODGKIN

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	94,91	90,90	83,29
2a_M	91,69	89,45	80,76
3a_M	90,43	88,02	75,56
4a_M	89,25	88,52	75,56
5a_M	90,33	86,96	75,56
1a_F	96,66	90,56	96,70
2a_F	93,14	86,72	93,23
3a_F	91,70	84,84	93,28
4a_F	92,47	84,93	93,28
5a_F	93,33	83,04	86,85



Anno 2017. Prevalenza osservata. LINFOMA DI HODGKIN

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	26	9,28	20	6,89
2010	33	11,78	25	8,62
2011	39	13,92	35	12,06
2012	51	18,20	44	15,16
2013	60	21,42	54	18,61
2014	69	24,63	62	21,37
2015	77	27,48	72	24,81
2016	88	31,41	84	28,95
2017	93	33,19	93	32,05



Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. LINFOMA DI HODGKIN

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Linfonodo	140	96,60		Linfonodo	125	94,70
Sistema emopoietico	0	0,00		Sistema emopoietico	0	0,00
Milza	0	0,00		Milza	2	1,50
Testa e collo	1	0,70		Testa e collo	1	0,80
Cute	0	0,00		Cute	0	0,00
Stomaco	0	0,00		Stomaco	0	0,00
Altre sedi	3	2,10		Altre sedi	2	1,50
Non noto	1	0,70		Non noto	2	1,50

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. LINFOMA DI HODGKIN

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Predominanza linfocitaria	13	10,00		Predominanza linfocitaria	8	6,45
Sclerosi nodulare	73	56,15		Sclerosi nodulare	72	58,06
Cellularità mista	21	16,15		Cellularità mista	22	17,74
Deplezione linfocitaria	2	1,54		Deplezione linfocitaria	1	0,81
Non specificato	21	16,15		Non specificato	21	16,94

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

