


TESTA E COLLO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. TESTA E COLLO

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	996	220
% sul totale	3,5	1
Tasso grezzo	26,9	5,7
Tasso standardizzato	27,7	5,1
Rischio cumulativo	1,7	0,3
Età media	65,4	67,3
Età mediana	65,5	71
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	1,03	0,85
Oss/Att Centro (2008-2013)	1,24	0,99
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,95	0,74
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,14	1,08


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. TESTA E COLLO

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	74	28,42	3,36	20	6,52	1,48
2006	64	24,31	3,07	12	3,66	1,07
2007	72	27,27	3,26	10	3,09	0,99
2008	70	26,16	3,17	14	4,28	1,16
2009	72	26,57	3,16	17	5,13	1,26
2010	82	30,32	3,38	14	4,16	1,13
2011	87	30,71	3,31	18	5,68	1,36
2012	77	28,03	3,22	21	6,38	1,42
2013	84	30,06	3,30	15	4,27	1,14
2014	74	26,36	3,08	15	4,24	1,12
2015	84	28,87	3,17	23	7,17	1,52
2016	83	28,52	3,16	21	6,24	1,41
2017	73	24,94	2,94	20	5,58	1,28




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza TESTA E COLLO

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,57	0,00
10-14	0,52	0,56
15-19	0,47	0,50
20-24	2,14	0,45
25-29	0,81	0,85
30-34	2,34	1,61
35-39	2,24	1,87
40-44	11,33	1,40
45-49	24,97	4,19
50-54	32,31	5,92
55-59	51,31	5,23
60-64	63,11	10,12
65-69	69,27	11,34
70-74	79,60	16,67
75-79	75,17	12,46
80-84	83,46	24,80
85+	94,70	15,82




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. TESTA E COLLO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	82,66	77,85	82,71
2a_M	69,12	65,33	73,62
3a_M	60,21	56,21	67,32
4a_M	55,56	53,49	62,29
5a_M	52,02	52,27	58,52
1a_F	79,10	80,25	86,17
2a_F	64,57	67,98	64,60
3a_F	61,07	61,95	58,22
4a_F	60,67	58,20	52,10
5a_F	58,77	59,43	52,09



Anno 2017. Prevalenza osservata. TESTA E COLLO

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	128	45,69	32	11,03
2010	182	64,96	46	15,85
2011	222	79,24	52	17,92
2012	256	91,37	61	21,02
2013	287	102,58	73	25,16
2014	325	116,30	81	27,91
2015	355	127,01	85	29,29
2016	375	134,15	88	30,33
2017	400	143,07	91	31,36





Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. TESTA E COLLO


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Labbro	90	9,00		Labbro	15	6,80
Bocca	103	10,30		Bocca	45	20,50
Lingua	144	14,50		Lingua	41	18,60
Ghiandole salivari	43	4,30		Ghiandole salivari	38	17,30
Orofaringe	70	7,00		Orofaringe	14	6,40
Rinofaringe	50	5,00		Rinofaringe	16	7,30
Ipfaringe	51	5,10		Ipfaringe	3	1,40
Faringe, NAS	19	1,90		Faringe, NAS	2	0,90
Cavità nasale	40	4,00		Cavità nasale	18	8,20
Laringe	386	38,80		Laringe	28	12,70

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. TESTA E COLLO


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Squamocellulare	736	88,36		Squamocellulare	125	72,67
Adenocarcinoma	31	3,72		Adenocarcinoma	21	12,21
Carcinoma NAS	43	5,16		Carcinoma NAS	14	8,14
Altre morfologie	20	2,40		Altre morfologie	12	6,98
Non specificato	3	0,36		Non specificato	0	0,00

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI



FEMMINE

